



	Comp. Description // Producto: PI EXELON CP_AR	V-07
	Country // País: Argentina	
Component // Material: PIL Dimension // Dimensiones: 594 x 148 mm Comp. Number // Código de material: 37125247-00 Manufacturer Comp. Number // Código Material del fabricante: 1145663-B22-AR Termination / Grammage / Others: See Technical specification Terminaciones / Gramaje / Otros: Ver especificación técnica	Printing Colours: Black	Technical Colours: — Cutting — Indications — Dimensions

594 mm



INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

EXELON®

RIVASTIGMINA

Cápsulas

Sistema Terapéutico Transdérmico (parche transdermal)

Venta bajo receta Industria Española

<p>Lea este prospecto detenidamente antes de administrar Exelon®</p> <p>Conserve este prospecto. Es posible que lo deba volver a leer.</p> <p>Si tiene alguna duda, pregunte a su médico o al farmacéutico.</p> <p>Este medicamento ha sido prescrito sólo para usted. No se lo dé a otras personas o utilice para otras enfermedades.</p> <p>Si alguno de los efectos secundarios lo afecta de forma severa o si usted nota algún efecto secundario no indicado en este prospecto, por favor, dígaselo a su médico o farmacéutico.</p>

FÓRMULA

Cada cápsula de Exelon® 1,5 mg contiene: Rivastigmina (como hidrógeno tartrato) 1,5 mg

Excipientes: sílica coloidal anhidra 0,8 mg, hidroxipropilmetilcelulosa 1 mg, estearato de magnesio 1,5 mg, celulosa microcristalina 154,3 mg, gelatina 61,27 mg, óxido de hierro amarillo 0,11 mg, dióxido de titanio 0,62 mg, tinta de impresión a base de óxido de hierro rojo c.s.

Cada cápsula de Exelon® 3 mg contiene: Rivastigmina (como hidrógeno tartrato) 3 mg
Excipientes: sílica coloidal anhidra 0,8 mg, hidroxipropilmetilcelulosa 2 mg, estearato de magnesio 1,5 mg, celulosa microcristalina 150,9 mg, gelatina 60,73 mg, óxido de hierro rojo 0,04 mg, óxido de hierro amarillo 0,4 mg, dióxido de titanio 0,83 mg, tinta de impresión a base de óxido de hierro rojo c.s.

Cada cápsula de Exelon® 4,5 mg contiene: Rivastigmina (como hidrógeno tartrato) 4,5 mg
Excipientes: sílica coloidal anhidra 0,8 mg, hidroxipropilmetilcelulosa 2 mg, estearato de magnesio 1,5 mg, celulosa microcristalina 148,5 mg, gelatina 60,81 mg, óxido de hierro rojo 0,29 mg, óxido de hierro amarillo 0,28 mg, dióxido de titanio 0,62 mg, tinta de impresión a base de dióxido de titanio c.s.

Cada cápsula de Exelon® 6 mg contiene: Rivastigmina (como hidrógeno tartrato) 6 mg
Excipientes: sílica coloidal anhidra 0,8 mg, hidroxipropilmetilcelulosa 2 mg, estearato de magnesio 1,5 mg, celulosa microcristalina 146,1 mg, gelatina 60,76 mg, óxido de hierro rojo 0,14 mg, óxido de hierro amarillo 0,35 mg, dióxido de

titanio 0,75 mg, tinta de impresión a base de óxido de hierro rojo c.s.

EN ESTE PROSPECTO:

¿Qué es Exelon® y para qué se utiliza?

Antes de tomar Exelon®

¿Cómo tomar Exelon®?

Posibles efectos adversos

¿Cómo conservar Exelon®?

Presentaciones

¿QUÉ ES EXELON® Y PARA QUÉ SE UTILIZA?

Exelon® pertenece a un grupo de sustancias denominadas inhibidores de la colinesterasa. Se utiliza para el tratamiento de trastornos de la memoria en pacientes con enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson.

ANTES DE TOMAR EXELON®

Siga cuidadosamente las indicaciones que le han dado el médico o el farmacéutico, incluso si difieren de la información contenida en este prospecto.

Lea la siguiente información antes de tomar Exelon®.

No tome Exelon®

- Si usted es alérgico (hipersensible) a Rivastigmina (el principio activo de Exelon®) o a cualquiera de los excipientes mencionados anteriormente.
- Si usted ha padecido reacciones alérgicas a un medicamento similar alguna vez.
- Si usted ha tenido reacciones de la piel que se extienden más allá del tamaño del parche de Exelon®, si existe una reacción local más

intensa (por ejemplo, ampollas, inflamación de la piel en aumento, hinchazón) y si los síntomas no mejoran significativamente en un plazo de 48 horas después de la remoción del parche.



Si usted se encuentra en cualquiera de estas situaciones, dígaselo al médico antes de tomar Exelon®.

Tenga especial cuidado con Exelon®

- Si tiene reacciones gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Usted puede deshidratarse (pérdida excesiva de líquidos) en caso de vómitos o diarrea prolongada.
- Si usted sufre o ha sufrido de latidos irregulares del corazón.
- Si usted sufre o ha sufrido de úlcera estomacal activa.
- Si usted sufre o ha sufrido de dificultad para orinar.
- Si usted sufre o ha sufrido de crisis epilépticas (convulsiones).
- Si usted sufre o ha sufrido de asma o enfermedad respiratoria grave.
- Si usted sufre de temblores.
- Si usted tiene bajo peso corporal (menos de 50 Kg).
- Si tiene problemas renales o hepáticos.

Si usted se encuentra en cualquiera de estas situaciones, su médico quizás deba realizarle controles frecuentes de su estado de salud durante el tratamiento con este medicamento.

Si usted no ha tomado Exelon® durante más de 3 días, no tome la dosis siguiente hasta que haya hablado con su médico.



Uso de otros medicamentos

Informe a su médico o farmacéutico si usted está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluidos los de venta sin receta.

Exelon® no se debe administrar con otros medicamentos similares (agentes colinómiméticos) o con medicamentos anticolinérgicos (por ejemplo, medicamentos utilizados para aliviar los calambres o espasmos estomacales o para prevenir el mareo).

Exelon® no debe ser administrado junto a metoclopramida (un fármaco usado para aliviar o prevenir las náuseas y vómitos). Puede haber efectos aditivos tales como rigidez en las extremidades o manos temblorosas.

Si usted debe ser objeto de una intervención quirúrgica durante el tratamiento con Exelon®, diga a su médico que usted toma Exelon® antes de que le administren cualquier anestésico, pues Exelon® puede potenciar los efectos de algunos relajantes musculares durante la anestesia.

Se debe tener precaución cuando se administra Exelon® junto a beta-bloqueantes (fármacos tales como atenolol, usado para tratar la hipertensión, angina, y otras condiciones cardíacas). Puede haber efectos aditivos tales como bradicardia (frecuencia cardíaca lenta) que puede resultar en síncope (desmayo, pérdida de la consciencia).

Toma de Exelon® con los alimentos y las bebidas
Usted debe tomar Exelon® dos veces al día, una vez con el desayuno y otra con la cena. Ingiera las cápsulas enteras con un poco de líquido, sin

abrir las ni aplastarlas.

Pacientes de edad avanzada (de 65 años o más)

Los pacientes de edad avanzada pueden tomar Exelon®.

Niños y adolescentes

El uso de Exelon® no ha sido estudiado en niños y por eso Exelon® no debe usarse en esta población.

Embarazo y Lactancia

En caso de embarazo, se han de sopesar las ventajas de Exelon® frente a los posibles riesgos para el feto.

Dígale a su médico si usted está embarazada o tiene previsto estarlo.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento durante el embarazo.

Las madres lactantes no deben amamantar durante el tratamiento con Exelon®.

Consulte con su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento durante la lactancia.

Conducción de vehículos y manejo de máquinas

El médico decidirá si la enfermedad que usted padece le permitirá conducir vehículos u operar máquinas sin peligro. Exelon® puede causar mareos y somnolencia, principalmente al comienzo del tratamiento o con el aumento de la dosis. Por consiguiente, aguarde a conocer los efectos del fármaco antes de emprender tales actividades.

Si se siente mareado o somnoliento, no conduzca o utilice maquinarias, ni realice otras tareas que

requieran de su atención.

¿CÓMO TOMAR EXELON®?

Siga cuidadosamente las instrucciones que le ha dado su médico. No exceda la dosis recomendada.

¿Cuánto Exelon® tomar?

Su médico le indicará la dosis de Exelon® que usted debe tomar; primero la dosis será pequeña y luego quizás aumente gradualmente, según como usted responda al tratamiento. La dosis máxima es de 6 mg dos veces al día.

¿Cuándo tomar Exelon®?

Usted debe tomar Exelon® dos veces al día, una vez con el desayuno y otra con la cena. De este modo tomando Exelon® cada día en el mismo horario, lo ayudará a recordar cuándo debe tomar su medicamento.

¿Cómo tomar Exelon®?

Ingiera las cápsulas enteras con un poco de líquido, sin abrir las ni aplastarlas.

¿Por cuánto tiempo tomar Exelon®?

Para sacar provecho del medicamento usted debe tomarlo todos los días.

Diga a la persona que lo cuida que usted toma Exelon® y también dígame si usted no ha tomado Exelon® durante más de 3 días.

La prescripción de este medicamento requiere asesoramiento experto antes de iniciar el tratamiento, así como un control asiduo del beneficio terapéutico.

El médico también le controlará el peso durante el tratamiento con Exelon®.

Si Ud. tiene preguntas de cuánto tiempo debe tomar Exelon®, consulte con su médico o farmacéutico.

¿Qué hacer en caso de exceso de Exelon®?

Comuníquese al médico si usted ha tomado accidentalmente

más Exelon® de lo indicado. Es posible que usted necesite atención médica. Las personas que han tomado una sobredosis de Exelon® por accidente experimentaron náuseas, vómitos, diarrea, un aumento de la presión arterial y alucinaciones. También se han observado desaceleraciones del ritmo cardíaco y desvanecimientos.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247

Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

¿Qué hacer en caso de olvido de Exelon®?

Si usted se ha olvidado de tomar una dosis, aguarde y tome la próxima dosis en el momento debido. No duplique la dosis de Exelon® para compensar la dosis faltante.

Si usted deja de tomar Exelon®

No deje de tomar Exelon® o cambie la dosis sin consultar con su médico.

Si usted no ha tomado Exelon® durante más de 3

37125247-00

1145663-B22-AR

