

## Galexig®

Selexipag 0,2 mg

Selexipag 0,4 mg

Selexipag 0,8 mg

Comprimidos recubiertos

**Leer este prospecto antes de comenzar a tomar Galexig® y cada vez que sea prescripta una nueva receta. Puede haberse incluido nueva información. Esta información no sustituye su visita al profesional encargado de su atención médica sobre su estado clínico o su tratamiento**

### ¿Qué es Galexig®?

- Galexig® es un medicamento de venta bajo receta utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar (HAP), que es alta presión sanguínea en las arterias de los pulmones.
- Galexig® puede ayudar a ralentizar la progresión de la enfermedad y reducir el riesgo de hospitalización por HAP.

Se desconoce si Galexig® es seguro y efectivo en niños.

### ¿Qué debe comunicar el paciente a su médico antes de tomar Galexig®?

**Antes de ingerir Galexig®, el paciente deberá informar al profesional médico si:**

- Tiene problemas de hígado.
- Tiene un estrechamiento de las venas pulmonares, una condición denominada enfermedad pulmonar veno-oclusiva.
- Está embarazada o piensa quedar embarazada. Se desconoce si Galexig® puede dañar al bebé por nacer.
- Está amamantando o piensa amamantar. Se ignora si Galexig® pasa a la leche materna. El paciente y el profesional médico deberán decidir si tomar Galexig® o amamantar. No se deberán hacer ambas cosas.
- Tiene cualquier otra condición médica.

**Informar al médico sobre toda la medicación que el paciente está tomando**, incluyendo medicamentos recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. Galexig® y otros medicamentos pueden afectar a cada uno de los otros causando efectos secundarios. No iniciar la toma de ningún medicamento nuevo hasta no contar con la confirmación del profesional médico.

### ¿Cómo se debe tomar Galexig®?

Tomar Galexig® tal como el médico lo indique. No suspender la toma de Galexig® a menos que el médico lo indique.

El médico aumentará gradualmente la dosis hasta alcanzar la dosis adecuada de Galexig®.

En caso de efectos secundarios, el médico puede indicar al paciente que cambie su dosis de Galexig®.

Galexig® puede ingerirse con o sin alimentos. La administración de Galexig® con alimentos puede ayudar a tolerar mejor el medicamento.

Galexig® se administra generalmente 2 veces al día.

Ingerir los comprimidos de Galexig® enteros. No partir, triturar ni masticar los comprimidos de Galexig®.

Si el paciente olvida tomar una dosis de Galexig®, deberá tomarla tan pronto como lo recuerde. Si la próxima dosis está programada dentro de 6 horas, saltar la dosis olvidada. Tomar la próxima dosis en el horario normal.

Si el paciente olvida tomar Galexig® por 3 o más días, consultar al médico si la dosis necesita ser cambiada.

En caso de sobredosificación de Galexig®, llamar al médico o concurrir a la emergencia del hospital más cercano inmediatamente.

### ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Galexig®?

• dolor de cabeza	• diarrea
• dolor mandibular	• náuseas
• dolor muscular	• vómitos
• dolor en brazos o piernas	• sofocación
• dolor en las articulaciones	• recuento bajo de glóbulos rojos
• disminución del apetito	• rash

Estos no son todos los posibles eventos adversos de Galexig®.

Llamar al médico para recibir orientación sobre los efectos colaterales.

### No tome Galexig®.

- Si es alérgico a Selexipag o a alguno de los demás componentes de este medicamento.
- Si tiene algún trastorno en el corazón, como:
  - flujo sanguíneo disminuido a los músculos cardíacos (cardiopatía isquémica grave o angina inestable); los síntomas pueden incluir dolor torácico.
  - infarto de miocardio en los 6 últimos meses
  - debilidad cardíaca (insuficiencia cardíaca descompensada) sin estricta supervisión médica.
  - latido cardíaco irregular grave.
  - defecto en las válvulas cardíacas (congénito o adquirido) que hace que el corazón funcione con dificultad (no relacionado con la hipertensión pulmonar)
  - si ha sufrido algún accidente cerebrovascular (ictus) en los 3 últimos meses, o cualquier otro evento de reducción del flujo sanguíneo al cerebro (p. ej., accidente isquémico transitorio)
  - si está tomando gemfibrozilo (medicamento utilizado para reducir el nivel de grasas (lípidos) en la sangre)

### ¿Cómo se debe conservar Galexig®?

Conservar Galexig® comprimidos a temperatura ambiente entre 15°C y 30°C.

### Mantener Galexig® y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

### Información general sobre el uso seguro y eficaz de Galexig®

A veces los medicamentos se recetan para otros fines no indicados en el folleto de información para el paciente. No utilizar Galexig® en casos para los que no fue prescripto. No administrar Galexig® a otras personas, incluso en el caso de que presenten los mismos síntomas. Puede ser perjudicial. Consultar al médico o al farmacéutico para obtener la información sobre Galexig® destinada a los profesionales de la salud.

### ¿Cuáles son los ingredientes en Galexig®?

**Ingrediente activo:** Selexipag

**Ingredientes inactivos:** D-manitol, Almidón de maíz, Hidroxipropilcelulosa de baja sustitución, Hidroxipropilcelulosa y Estearato de magnesio. Los comprimidos están recubiertos por una película con un material de recubrimiento que contiene Hidroxipropilmetilcelulosa, Dióxido de Titanio, Talco, Óxido de Hierro amarillo, Amarillo de Quinolina.

### PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Los comprimidos de Galexig® están acondicionados en blíster, conteniendo 10 comprimidos por blíster:

- 60 comprimidos por estuche.
- 140 comprimidos por estuche.

El estuche debe almacenarse a temperatura ambiente 15°C y 30°C. Se deben conservar en el estuche original.

### MANTENGA LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS