

Renseignements destinés aux patient·e·s

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

WYNZORA^{MD}

Crème au calcipotriol et au dipropionate de bétaméthasone

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont rédigés pour la personne qui prendra WYNZORA^{MD}. Il peut s'agir de vous ou d'une personne dont vous vous occupez. Lisez attentivement ces renseignements. Conservez-les, car vous devrez peut-être les relire.

Ces Renseignements destinés aux patient·e·s sont un résumé. Ils ne sont pas complets. Si vous avez des questions au sujet de ce médicament ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de WYNZORA^{MD}, adressez-vous à un professionnel de la santé.

À quoi sert WYNZORA^{MD} :

WYNZORA^{MD} est appliqué sur la peau chez l'adulte pour traiter le psoriasis vulgaire pendant une période maximale de 8 semaines. D'après les résultats des études menées chez l'adulte, WYNZORA^{MD} peut également être utilisé chez les adolescents de 12 à 17 ans.

Comment fonctionne WYNZORA^{MD} :

WYNZORA^{MD} contient deux médicaments : du calcipotriol et de la bétaméthasone, qui agissent ensemble pour maîtriser le psoriasis.

Le calcipotriol aide à ralentir la croissance accélérée des cellules cutanées touchées par le psoriasis. La bétaméthasone, médicament de la classe des corticostéroïdes, aide à réduire l'inflammation (rougeur, enflure et démangeaisons).

Vous pourriez commencer à voir une amélioration de l'aspect de votre peau en l'espace de quelques semaines. Les signes que WYNZORA^{MD} agit comprennent une diminution des zones de peau qui pèle, de la rougeur et des démangeaisons.

Les ingrédients de WYNZORA^{MD} sont :

Ingrédients médicinaux : calcipotriol et bétaméthasone (sous forme de dipropionate de bétaméthasone).

Ingrédients non médicinaux : alpha-tocophérol, butylhydroxyanisole, interpolymère de carbomère (type A), phosphate disodique heptahydraté, alcool isopropylique, myristate d'isopropyle, triglycérides à chaîne moyenne, huile minérale, poloxamère (407), phosphate monosodique monohydraté, huile de ricin hydrogénée PEG-40, éther laurylique de polyoxyéthylène, eau purifiée et trolamine.

WYNZORA^{MD} se présente sous la forme posologique suivante :

Crème : 0,05 mg/g de calcipotriol et 0,5 mg/g de bétaméthasone (sous forme de dipropionate de bétaméthasone)

N'utilisez pas WYNZORA^{MD} dans les cas suivants :

- vous êtes allergique à un des ingrédients entrant dans la composition de WYNZORA^{MD}.
- vous êtes allergique à l'une des composantes du contenant (p. ex., l'aluminium).
- vous avez une affection qui perturbe les taux de calcium.
- vous souffrez d'une infection cutanée causée par un virus, un champignon, une bactérie ou un parasite.

- vous avez une maladie de la peau liée à la tuberculose.
- vous présentez une éruption cutanée autour de la bouche appelée « dermite périorale »; vous ne devez pas appliquer WYNZORA^{MD} sur cette zone.
- vous avez des zones de peau mince, des vergetures ou des veines fragiles; vous ne devez pas appliquer WYNZORA^{MD} sur ces zones.
- vous présentez une affection appelée « ichtyose », caractérisée par la sécheresse et l'épaississement de la peau, qui devient squameuse; vous ne devez pas appliquer WYNZORA^{MD} sur ces zones.
- vous souffrez d'acné rosacée (qui cause une rougeur de la peau du visage), des ulcères ou des lésions; vous ne devez pas appliquer WYNZORA^{MD} sur ces zones.
- vous avez un type de psoriasis avec une inflammation grave, appelé « psoriasis érythrodermique ».
- vous avez un type de psoriasis avec des ampoules (cloques) remplies de pus, appelé « psoriasis pustuleux ».
- vous avez un type de psoriasis qui cause une desquamation (peau qui pèle) étendue.

L'utilisation de WYNZORA^{MD} n'est pas approuvée chez les enfants de moins de 12 ans.

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser WYNZORA^{MD}, afin d'assurer l'utilisation adéquate du médicament et d'aider à éviter les effets secondaires. Informez votre professionnel de la santé de votre état actuel et de vos problèmes de santé, notamment si :

- vous souffrez du diabète.
- vous avez une infection cutanée ou les zones de peau atteintes de psoriasis se sont infectées.
- vous présentez une affection appelée « psoriasis en gouttes ».
- vous prenez d'autres médicaments contenant des corticostéroïdes ou du calcipotriol.
- vous avez des problèmes de foie.
- vous avez des problèmes de rein.

Autres mises en garde à connaître :

Application de WYNZORA^{MD}

N'appliquez pas WYNZORA^{MD} sur votre visage, dans vos yeux ou autour de vos yeux, sur vos aisselles, dans la région de l'aîne, dans les plis cutanés ou sur des zones de peau éraflée.

Après l'application de WYNZORA^{MD}, ne pansez pas, ne couvrez pas ou n'enveloppez pas la zone de peau traitée.

Évitez d'appliquer d'autres médicaments stéroïdiens sur la même zone de peau que WYNZORA^{MD}. Lavez-vous toujours les mains après chaque application afin d'éviter que le médicament ne se propage à d'autres zones ou ne soit absorbé par vos mains. L'utilisation prolongée de WYNZORA^{MD} peut accroître le risque d'effets secondaires; parlez-en à votre professionnel de la santé. Il est recommandé d'interrompre le traitement de temps en temps. L'arrêt du traitement peut entraîner une aggravation soudaine du psoriasis ou une réaction cutanée grave caractérisée par l'apparition de cloques et de bosses appelée « psoriasis pustuleux généralisé ».

Grossesse

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser WYNZORA^{MD} si vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez le devenir. On ne sait pas si l'utilisation de WYNZORA^{MD} est sûre pendant la grossesse. Comme WYNZORA^{MD} peut nuire au bébé à naître, son utilisation doit être la plus courte possible et limitée à la plus petite quantité nécessaire. Consultez votre professionnel de la santé si vous

avez des questions à ce sujet.

Allaitement

Consultez votre professionnel de la santé avant d'utiliser WYNZORA^{MD} si vous allaitez ou prévoyez allaiter. On ne sait pas si l'utilisation de WYNZORA^{MD} est sûre pendant l'allaitement, car l'un de ses ingrédients pourrait passer dans le lait maternel et nuire au bébé. N'appliquez pas WYNZORA^{MD} sur vos seins si vous allaitez. Consultez votre professionnel de la santé si vous avez des questions à ce sujet.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine parallèle.

Comment utiliser WYNZORA^{MD} :

- Utilisez WYNZORA^{MD} exactement comme votre professionnel de la santé vous a indiqué de le faire; suivez ses instructions à la lettre.
- Appliquez WYNZORA^{MD} seulement sur les zones de peau atteintes de psoriasis et pas sur une peau saine.
- Pressez la crème sur un doigt propre ou directement sur la zone atteinte de psoriasis.
- Appliquez la crème en frottant doucement avec le bout du doigt pour la faire pénétrer, jusqu'à l'obtention d'une fine couche. Veillez à ce que les plaques de psoriasis soient bien imprégnées de crème.
- N'appliquez pas de bandage sur la peau traitée, ne la couvrez pas avec un pansement serré et ne l'enveloppez pas.
- Lavez-vous les mains après avoir utilisé WYNZORA^{MD}. Cette mesure permettra de ne pas mettre de la crème accidentellement sur d'autres endroits du corps (comme le visage, la bouche ou les yeux).
- Si vous appliquez involontairement de la crème sur la peau saine autour des zones de psoriasis, vous pouvez la laisser, mais essuyez-la si elle se répand trop largement.
- Afin d'assurer que WYNZORA^{MD} exerce son plein effet, il est conseillé de ne pas prendre de douche ou de bain après l'avoir appliqué. Il est recommandé d'attendre huit heures entre l'application de WYNZORA^{MD} et une douche pour éviter d'éliminer le produit avec le lavage.

Lors de l'utilisation sur le cuir chevelu :

- Avant d'appliquer WYNZORA^{MD} sur le cuir chevelu, peignez vos cheveux pour éliminer les pellicules.
- Il peut être utile de dessiner une raie dans vos cheveux avant d'appliquer WYNZORA^{MD}.
- Il n'est pas nécessaire de vous laver les cheveux avant d'appliquer WYNZORA^{MD}.

Dose habituelle :

Appliquez WYNZORA^{MD} une fois par jour sur les zones atteintes. Continuez à utiliser WYNZORA^{MD} jusqu'à la disparition complète de vos lésions, pendant un maximum de 8 semaines. Vous devez consulter votre professionnel de la santé si vous souhaitez l'utiliser pendant plus de 8 semaines ou avant de reprendre le traitement.

N'utilisez pas plus de 15 grammes de WYNZORA^{MD} par jour, ou plus de 100 grammes par semaine. Si vous utilisez d'autres médicaments contenant du calcipotriol en plus de WYNZORA^{MD}, la quantité totale de calcipotriol provenant de tous les médicaments ne doit pas dépasser 15 grammes par jour ou 100 grammes par semaine. N'appliquez pas WYNZORA^{MD} sur plus de 30 % de votre corps, incluant votre cuir chevelu. Les adolescents peuvent avoir plus d'effets secondaires que les adultes, car la surface de peau traitée est grande par rapport à leur poids.

Surdose :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez utilisé trop de WYNZORA^{MD}, contactez immédiatement votre professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital, votre centre antipoison régional ou le numéro sans frais de Santé Canada, 1-844 POISON-X (1-844-764-7669), même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous oubliez une dose, appliquez-la aussitôt que vous vous en rendez compte, puis reprenez votre horaire d'application habituel. N'appliquez jamais WYNZORA^{MD} deux fois dans la même journée pour compenser une dose oubliée.

Effets secondaires possibles de l'utilisation de WYNZORA^{MD} :

Voici certains des effets secondaires que vous pourriez ressentir lorsque vous utilisez WYNZORA^{MD}. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent comprendre les suivants :

- Démangeaisons
- Éruption cutanée (rash)
- Urticaire
- Irritation
- Douleur au point d'application
- Eczéma
- Desquamation (peau qui pèle)
- Rougeur et enflure des follicules pileux
- Insomnie
- Sensation de brûlure ou de picotements
- Sécheresse et rougeur de la peau
- Sensibilité à la lumière du soleil
- Amincissement de la peau, vergetures ou veines proéminentes
- Modifications de la pousse des cheveux ou des poils
- Éruption cutanée autour de la bouche
- Éclaircissement passager de la couleur de la peau
- Petites bosses blanches sur la peau

Effets secondaires graves et mesures à prendre à leur égard

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Peu fréquent			
Aggravation du psoriasis : plaques de peau rouges, squameuses et épaisses		√	
Rare			

Fréquence/effet secondaire/symptôme	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez d'utiliser le médicament et obtenez immédiatement de l'aide médicale
	Dans les cas sévères seulement	Dans tous les cas	
Psoriasis pustuleux : frissons, malaise, fièvre, mal de tête, arthralgie, perte de l'appétit, nausées, plaque rouge avec bosses ou cloques jaunes remplies de liquide, douleur cutanée ou démangeaisons			✓
Atteinte surrénalienne (production insuffisante d'hormones par les glandes surrénales) : fatigue, augmentation des mictions ou de la soif, difficulté à maîtriser la glycémie, faiblesse, perte de poids		✓	
Troubles visuels : vision brouillée, douleur ou pression dans les yeux, difficulté à voir clairement, halos autour des sources lumineuses, couleurs délavées ou jaunâtres		✓	
Très rare			
Réaction allergique : étourdissements, démangeaisons, urticaire ou éruption cutanée, enflure du visage, de la langue, des lèvres ou de la gorge, difficulté à respirer ou à avaler			✓
Hypercalcémie (taux élevé de calcium dans votre sang) : constipation, dépression, fatigue, augmentation des mictions ou de la soif, perte de l'appétit, confusion mentale, nausées, vomissements, faiblesse ou douleur musculaire, palpitations cardiaques			✓

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer à Santé Canada des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation des produits de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En consultant la page Web sur la déclaration des effets indésirables ([Canada.ca/medicament-instrument-declaration](https://canada.ca/medicament-instrument-declaration)) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier, ou par télécopieur; ou
- En téléphonant sans frais au 1-866-234-2345.

Remarque : Consultez votre professionnel de la santé si vous souhaitez obtenir des renseignements sur la prise en charge des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation :

- Conserver WYNZORA^{MD} entre 15 et 25 °C.
- Ne pas congeler.
- Conserver à l'abri de la lumière et de la chaleur excessive.
- Jeter tout reste de produit six mois après l'ouverture du tube.
- Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur WYNZORA^{MD} :

- Parlez-en avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patient·e·s. Ce document se trouve sur le site Web de Santé Canada ([Base de données sur les produits pharmaceutiques : Accéder à la base de données](#)) et sur le site Web du fabricant (<https://knighttx.com>) ou peut être obtenu en écrivant au medinfo@knighttx.com ou en téléphonant au 1-844-483-5636.

Le présent feuillet a été rédigé par Thérapeutique Knight inc.

Date d'approbation : 2025-11-21